FLEURUS®

FONGICIDE CONTRE LE BOTRYTIS

F O N G I C I D E

FONGICIDE CONTRE LE BOTRYTIS

- Un positionnement à tous les stades de lutte contre la pourriture grise
- Fongicide préventif et curatif
- Un mode d'action unique

La pourriture grise *(Botrytis cinerea)* est une maladie redoutée qui peut provoquer une baisse quantitative et surtout qualitative de la vendange.

Une attention particulière autour de cette maladie est requise pour assurer au viticulteur un rendement avec une production irréprochable.

Sur vigne, Fleurus® s'applique une seule fois par campagne, à un des positionnements suivants :

▶ FIN FLORAISON, CHUTE DES CAPUCHONS FLORAUX

Protection des blessures faites par l'abscission des pièces florales

▶ DÉBUT FERMETURE DE LA GRAPPE

Protection de l'intérieur de la grappe ainsi que celle des baies (suite aux blessures occasionnées par les vers de la grappe notamment)

▶ VÉRAISON

Protection des baies sans affecter leur maturité en empêchant le développement de la pourriture grise

UPL France - Tour Voltaire - 1 place des Degrés 92 800 PUTEAUX
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com - fr.uplonline.com

En savoir plus sur :

www.upl-ltd.com/fr

UPL OpenAg™

FLEURUS®

FLEURUS® est compatible avec la plupart des fongicides, régulateurs et insecticides usuels.
En cas de mélange il appartient à l'utilisateur de respecter toutes les précautions d'emploi mentionnées sur les étiquettes et les notices d'emploi par le fabricant de chaque produit associé.
Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de mélange ou utilisé seul, il appartient à l'utilisateur de tester le produit avant application et de consulter notre service technique.

LE PYRIMETHANIL : UNE MOLÉCULE ANTI-LACCASE

La laccase est une enzyme d'oxydation qui provoque une altération irréversible de la qualité des moûts. Elle est secrétée par la pourriture grise.
Le pyrimethanil a un double impact sur cette enzyme : il lutte directement contre la pourriture grise et inhibe le processus de sécrétion de cette enzyme par le champignon.

CARACTÉRISTIQUES ET RECOMMANDATIONS

- Fleurus® est neutre sur la faune auxiliaire
- Fleurus® est à l'abri du lessivage dès le séchage de la bouillie
- Localiser le produit sur la zone des grappes, en traitant face par face
- Fleurus® bénéficie d'une tolérance d'importation vers la plupart des pays, notamment les Etats Unis, le Canada et le Japon
- Fleurus® s'applique sur tous les cépages

USAGE ET DOSE

Usages homo-logués sur culture de référence	Cibles	Dose	Nombre d'applica-tions max.	DAR (jours)	ZNT (m)
Vigne	Botrytis	2,5L/ha	1	35	5
Pommier, poirier, cognassier, nashi, pommette	Tavelure	0,05L/ha	2	28	5

CONDITIONNEMENT

- 1 L (carton de 12*1 L) et 5 L (carton de 4*5 L)

UPL OpenAg™

UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Homologation : N° 2100143. Composition : 400 g/L de pyrimethanil sous forme de suspension concentrée (SC). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.