COLZAMID®

HERBICIDE COLZA - GESTION PRÉCOCE ET DURABLE DES ADVENTICES

HERBICIDE

UNE GESTION PRÉCOCE DE LA FLORE POUR UN BON DÉVELOPPEMENT DU COLZA

- La référence sur géraniums, gaillet et coquelicot
- Une gestion précoce des graminées (vulpin, ray grass et autres graminées)
- Une solution de désherbage optimale même en conditions sèches

USAGES Colzamid®	Dose AMM	Nbe pass maxi	ZNT aq.(m)	DAR (j)	DRE (h)
COLZA * désherbage	2,8	1	5	NA	6
CULTURES PORTE-GRAINES MINEURES *désherbage Radis, navet Mâche, chou	 2,2 2,8				
MACHE et ROQUETTE * désherbage	1,8			26	
PLANTES AROMATIQUES * désherbage : Bourrache, marjolaine, mélisse off., menthe, origan Millepertuis, reine des prés, sarriette, thym, valériane, Basilic, Sauge officinale	2,5 2 l/ha en post levée 1 l/ha en post levée			45	

CULTURES DE REMPLACEMENT

Possible sans restriction
Colza de printemps - Maïs - Pomme de terre - Tournesol

Possible après un labour profond
Chanvre - Féverole d'hiver - Féverole de printemps - Orge de printemps - Pois d'hiver - Pois de printemps - Soja - Trèfle

Risque de ralentissement de la croissance même après un labour
Moutarde

Déconseillé
Blé tendre d'hiver et blé dur - Betterave - Lentille - Lin - Luzerne - Ray Grass

UPL France - Tour Voltaire – 1 place des Degrés 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com - fr.uplonline.com

En savoir plus sur :

www.upl-ltd.com/fr

UPL OpenAg™

COLZAMID®

PREUVES AU CHAMP

La napropamide apporte régularité et efficacité aux programmes, notamment en cas de fortes infestations en géraniums et graminées. Le pré-semis permet de positionner le produit de manière optimale dans la zone de germination des adventices afin d'être absorbé par les zones de croissance. Dès lors qu'il est incorporé et même en conditions sèches, le produit conserve toute son efficacité. Essentiellement utilisée en cas de forte infestation de géraniums, la napropamide a également un important effet sur graminées. Utilisé à 2L/ha en pré-semis, Colzamid® (napropamide à 450 g/L) a des efficacités proches de 87% sur vulpin et 74% sur ray grass (source Terres Inovia® sur 340 essais). L'utilisation de Colzamid® en pré-semis incorporé a plusieurs effets bénéfiques :

- Une gestion précoce de la flore pour un bon développement du colza ;
- Une gestion durable des graminées : le profil moléculaire de la napropamide ne présente pas de résistance connue au groupe HRAC-K3.

POSITIONNEMENTS COLZAMID®

Colzamid® peut être utilisé en pré-semis incorporé ou en post-semis pré-levée.



EFFICACITÉ ENTRÉE HIVER COLZAMID® 2 L/HA EN PRÉ-SEMIS SUR GRAMINÉES

Synthèse de 6 essais colza (2018 -2019)
Pression Ray Grass de 60 à 350 m² / Bromes de 25 à 180 m² / Vulpins de 130 à 145 m²



CONSEILS D'APPLICATION

PRÉ-SEMIS INCORPORÉ

- La napropamide est photodégradable.
- Elle doit être incorporée dans les 3 premiers centimètres du sol.
- Une fois incorporée, la napropamide reste active pendant 4 mois environ.
- L'incorporation de Colzamid® permet de gagner en efficacité et régularité, même en conditions sèches.
- Pour une efficacité maximale, il faut appliquer Colzamid® en pré-semis incorporé à 2L/ha.

POST-SEMIS PRÉ-LEVÉE :

- Bien que l'efficacité soit optimale sur colza en pré-semis incorporé, Colzamid® peut également être positionné en pré-levée à 2L/ha. En cas de positionnement en pré-levée, appliquer l'herbicide juste après une pluie pour optimiser l'efficacité du produit.

UPL OpenAg™

UPL France est titulaire de l'agrément phytosanitaire N°9200008 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Homologation : N° 8800603. Composition : 450 g/L de napropamide sous forme de suspension concentrée (SC). Responsable de la mise en marché : UPL France. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com.

EUH401- Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaines et l'environnement;

H411- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme; EUH 208 - Contient 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.

DANGER

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.